

Ficha Técnica

BRASI NEXT RAÍCES

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1
LÍQUIDO



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

% P/V

Triacantanol triacontan-1-ol	0.01300
Brasinoesteroides (Homobrasinólido, Dolicolido, Homodolicólido, Brasinona)	0.00220
Vitamina B1 (tiamina) 2-[3-[(4-amino-2-metil-pirimida-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]etanol	0.00035
Vitamina B2 (riboflavina) 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona	0.00002
Vitamina B6 (piridoxina) 4,5-Bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol	0.00015

No. de Registro: RSCO-158/XII/14



HECHO EN E.U.A.
"ENVASADO EN MÉXICO"

Ficha Técnica



INSTRUCCIONES DE USO

BRASINEXT RAÍCES es un regulador de crecimiento de origen orgánico, promueve la floración y el aumento en el rendimiento de los cultivos. *BRASINEXT RAÍCES* debe aplicarse conforme a lo indicado en el siguiente cuadro:

CULTIVO	DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Tomate Rojo Tomate verde Chile Berenjena	Realizar cuatro aplicaciones: 1. Sumerja las raíces de las plántulas en bandejas en una solución al 0.75 – 1.0% de <i>BRASINEXT RAÍCES</i> hasta que hayan salido las burbujas de agua.
Tabaco	Aplique pocos días antes del trasplante con regadera sobre las plántulas en piletas impermeables o por aspersión sobre plántulas en bandejas, una solución 2 – 2.5% v/v, conteniendo 1 litro de <i>BRASINEXT RAÍCES</i> sobre las plántulas para una hectárea.
Cebolla Calabacita Melón Sandía Brócoli Col	Sumerja las raíces de las plántulas en bandeja en una solución al 0.75-1 % de <i>BRASINEXT RAÍCES</i> hasta que hayan salido las burbujas de aire o asperje 1 litro/hectárea a semillas o suelo al plantar.
Pepino	En pre-transplante asperje uniformemente una solución de 0.5 -1.0 ml /L de agua.
Lechuga	Sumerja las raíces de las plántulas en bandeja en una solución al 0.75-1 %.
Zanahoria	1. Asperje 1 L/ha a semillas y suelo al plantar.
Esparrago	Asperje 1 L/ha sobre el suelo a 15 días antes del brote.
Crisantemo Rosas Clavel	Nueva Plantación: Aplique <i>BRASINEXT RAÍCES</i> a raíces, bulbos o cornos de trasplante usando suficiente cantidad de una solución al 0.5-1% (equivalente a 1 L/ha) para contactar las superficies de estos cuando sean sembrados, o, alternativamente, sumérjalos en una solución al 5% antes de sembrar.
Fresa Zarzamora	Asperje hojas y suelo de 1 litro/hectárea de 30 días después de la siembra y cada 45 a 60 días durante la producción activa.

Aguacate

Cacao

Café

Ciruela

Coco

Durazno

Limón

Mandarina

Mango

Manzano

Naranja

Nogal

Papaya

Palma de aceite

Pera

Piña

Plátano

Toronja

Viveros almácigo:

1. Moje las semillas y suelo con una solución de 1% al sembrar.

2. Asperje 1 litro/hectárea 0.5% v/v sobre hojas y suelo mensualmente hasta trasplante.

Plantaciones nueva:

1. Sumerja brevemente las plántulas en solución de 5% antes de plantar o remoje en solución diluida con 10 ml de BRASINEXT RAÍCES por árbol.

Uva

Viveros o almácigo:

1. Moje las semillas y suelo con una solución de 1% al sembrar.

2. Asperje 1 litro/hectárea o 0.5% v/v sobre hojas y suelo cada 15 a 21 días hasta transplante.

Plantaciones nueva: 1. Sumerja brevemente las plántulas en solución al 5% antes del plantar o remoje en solución diluida con 5 ml de BRASINEXT RAÍCES por planta.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación quitando el sello de garantía, y utilizando la ropa adecuada como: botas, camisa de manga larga de algodón, goggles, guantes de neopreno. Para las aplicaciones foliares disolver el producto en agua necesaria para cubrir adecuadamente el cultivo a las dosis recomendadas. Efectuar el tratamiento en las horas más frescas del día. Es fundamental mojar uniformemente todas las hojas de la planta según las técnicas de la nutrición foliar. Las plantas tratadas tienen que tener buenas condiciones antes que los tratamientos comiencen.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO